Тест: "15.27 Сестринская помощь гинекологическим больным".

Тестируемый: _____ Дата: _____

Задание №1		
Женщины допускаются к донорству:		
1)		*через год после родов*
2)		*через день после менструации*
3)		*через месяц после периода лактации*

Задание №2		
К донорству допускаются лица, контактные по гепатитам В и С:		
1)		*через 6 месяцев*
2)		*через 1 год*
3)		*через 1 месяц*

Задание №3		
К кроводаче донор допускается после прививки убитыми вакцинами:		
1)		*через 6 месяцев*
2)		*через 10 дней*
3)		*через 1 месяц*

Задание №4		
После перенесения ОРВ, ангины, гриппа донор допускается к кроводаче через:		
1)		*10 дней*
2)		*1 месяц*
3)		*2 недели*

Задание №5		
Показаниями к гемотрансфузии являются:		
1)		*острая кровопотеря более 30% ОЦК*
2)		*снижение гематокрита ниже 25%*
3)		*кровопотеря до 10% ОЦК*
4)		*все виды анемий*

Задание №6		
Клиническое применение аутогемотрансфузий позволяет:		
1)		*увеличить объем заготовленной крови*
2)	_____	*существенно повысить безопасность трансфузионной терапии*

3)		*не проводить при переливании пробы на совместимость и биологическую пробу*

Задание №7		
Признаки непригодности крови к переливанию:		
1)		*однородно красная кровь*
2)		*наличие осадка эритроцитов, наличие слоя лейкоцитов и тромбоцитов*
3)		*наличие хлопьев в плазме*
4)		*отсутствие цветной полосы на этикетке*

Задание №8		
Оптимальная температура водяной бани для подогрева трансфузионной среды (в экстремальных условиях):		
1)		*+30 С*
2)		*+37 С*
3)		*+42 С*
4)		*+56 С*

Задание №9		
Оценка результата реакции при определении группы крови цоликлонами проводится по истечении:		
1)		*3 минут*
2)		*5 минут*
3)		*10 минут*

Задание №10		
Как проводится биопроба при переливании крови и ее компонентов?		
1)		*капельно 40-60 кап./мин.*
2)		*частыми каплями*
3)		*струйно*

Задание №11		
В течение какого срока необходимо оставлять остатки донорской крови в ампуле после ее переливания?		
1)		*2 часа*
2)		*12 часов*
3)		*48 часов*

Задание №12

Термометрия у больного после переливания крови проводится:		
1)		*2 раза через каждые 2 часа*
2)		*2 раза через каждый час*
3)		*4 раза через каждые 2 часа*
4)		*4 раза через каждый час*

Задание №13		
Причины, вызывающие гемолитические осложнения:		
1)		*переливание гемотрансфузионной среды, несовместимой по системе белков*
2)		*переливание гемотрансфузионной среды, несовместимой по системе резус*
3)		*переливание гемотрансфузионной среды, содержащей HbsAg*
4)		*переливание гемотрансфузионной среды, несовместимой по АВО-системе*

Задание №14		
К ранним признакам клиники посттрансфузионных осложнений нельзя отнести:		
1)		*тупые боли в пояснице, стеснение в груди*
2)		*общее беспокойство больного, познабливание*
3)		*слабый и частый пульс*
4)		*падение артериального давления*
5)		*пожелтение склер и кожных покровов больного*

Задание №15		
Какое заболевание не передается при переливании крови:		
1)		*СПИД*
2)		*Сифилис*
3)		*Дифтерия*
4)		*Токсоплазмоз*
5)		*вирусный гепатит В,С,Д*
6)		*вирусный гепатит А*
7)		*герпетическая инфекция*
8)		*ЦМВинфекция*

Задание №16
Пороки развития половых органов женщины могут возникнуть при:

1)		*заболеваниях матки (инфекционные, эндокринные)*
2)		*интоксикациях (алкоголь, наркотики, вредные химические вещества)*
3)		*осложнения беременности и родов (гестозы, гипоксия плода родовая травма ЦНС)*
4)		*радиация*
5)		*генетических аномалиях*
6)		*переохлаждении*

Задание №17		
Причины неправильных положений женских половых органов:		
1)		*акушерский травматизм*
2)		*врожденная неполноценность связочно-мышечного аппарата внутренних половых органов*
3)		*воспалительные заболевания внутренних половых органов женщины*
4)		*нарушение функции мочевого пузыря*

Задание №18		
При бимануальном обследовании у женщин определяют:		
1)		*величину матки*
2)		*подвижность матки*
3)		*топографию внутренних половых органов женщины*
4)		*величину яичников*
5)		*чувствительность гениталий*
6)		*проходимость маточных труб*

Задание №19		
К наружным половым органам женщины относятся:		
1)		*лобок*
2)		*клитор*
3)		*большие и малые половые губы*
4)		*девственная плева*
5)		*бартолиновы железы*
6)		*влагалище*

Задание №20		
К внутренним половым органам женщины относятся		
1)		*матка*
2)		*влагалище*
3)		*яичники с трубами*
4)		*бартолиновы железы*

Задание №21		
По выраженности волосистого покрова на лобке судят о:		
1)		*функции щитовидной железы*
2)		*проходимости маточных труб*
3)		*функции яичников*

Задание №22		
Функция бартолиновой железы состоит в:		
1)		*выработке женских половых гормонов*
2)		*увлажнении входа во влагалище*

Задание №23		
Наружное отверстие мочеиспускательного канала у женщины расположено:		
1)		*на 2 см ниже от клитора*
2)		*на 5 см кзади от клитора*

Задание №24		
Самым глубоким сводом влагалища у женщины является:		
1)		*передний свод*
2)		*задний свод*
3)		*боковые своды*

Задание №25		
Нормальное положение матки в малом тазу:		
1)		*гиперфлексия*
2)		*антефлексия и антеверзия*
3)		*петровезия*

Задание №26
Величина матки у нерожавшей женщины:

1)		*длина 7-8 см, ширина 4-5 см*
2)		*толщина 2 см*
3)		*длина 10 см, ширина 8 см, вес 100 г.*
4)		*длина 7 см, толщина 5 см, вес 50 г.*

Задание №27		
К эндоскопическим методам обследования гинекологических больных относятся:		
1)		*гистеросальпингография*
2)		*гистероскопия*
3)		*кульдоскопия*
4)		*лапароскопия*
5)		*кольпоскопия*

Задание №28		
При гистеросальпингографии определяют:		
1)		*рельеф слизистой шейки матки*
2)		*проходимость маточных труб*
3)		*величину матки*

Задание №29		
Независимые сестринские вмешательства при проведении гистеросальпингографии:		
1)		*придание больной удобного положения*
2)		*подготовка инструментария и лекарственных веществ для проведения манипуляции*
3)		*введение рентгенконтрастного вещества*

Задание №30		
Основная цель сестринских вмешательств при подготовке гинекологической больной к УЗИ органов малого таза:		
1)		*обеспечить наполнение мочевого пузыря*
2)		*устранить запоры*

Задание №31		
Заболевание наружных половых органов женщины, протекающее с выраженной атрофией подкожной жировой клетчатки наружных половых органов,атрофией сальных и потовых желез:		
1)		*крауроз вульвы*

2)		*папилломатоз*

Задание №32		
Воспалительные заболевания у женщин вызывают:		
1)		*стафилококки*
2)		*стрептококки*
3)		*ассоциация граммположительных и граммоотрицательных микроорганизмов, кишечная палочка, протей*

Задание №33		
IV степень чистоты влагалищного содержимого это:		
1)		*обильная кокковая флора, большое количество лейкоцитов, гнойные выделения*
2)		*единичные лейкоциты, палочка Додерлейна*

Задание №34		
Причины вульвитов:		
1)		*общие заболевания (сахарный диабет и др.)*
2)		*инфекционные возбудители*
3)		*механические факторы*
4)		*термические факторы*
5)		*нарушение менструального цикла*

Задание №35		
Воспалительные заболевания неспецифической этиологии влагалища и вульвы чаще возникают:		
1)		*в репродуктивном возрасте*
2)		*в детском и старческом возрасте*

Задание №36		
Кольповагиниты неспецифической этиологии чаще возникают на фоне:		
1)		*снижения уровня эстрогенов в организме*
2)		*повышения уровня эстрогенов в организме*

Задание №37		
Клинические формы воспаления наружных половых органов женщины:		
1)		*бартолинит, вульвит*
2)		*аднексит, метрит*
3)		*вульвит, вагинит*

Задание №38		
Хламидийная инфекция является причиной трубного бесплодия:		
1)		*часто*
2)		*редко*

Задание №39		
Характерный признак вируса простого герпеса:		
1)		появление отдельных или множественных везикул:
2)		*боли:*
3)		*бели*

Задание №40		
Патогенные свойства уреаплазм проявляются при снижении иммунитета:		
1)		*да*
2)		*нет*

Задание №41		
Зуд, жжение вульвы, дизурические явления, обильные пенистые бели зеленоватого оттенка у женщин характерны для:		
1)		*гонореи*
2)		*туберкулеза гениталий*
3)		*метроэндометрита*
4)		*кандидамикоза*
5)		*трихомониаза*

Задание №42		
Клиническими частыми признаками трихомониаза при беременности являются:		
1)		*кольпиты*
2)		*тяжелые формы метритов*
3)		*уретриты*
4)		*явления общей интоксикации*
5)		*всегда прерывание беременности*

Задание №43		
При трихомониазе плод:		
1)		*погибает всегда*
2)		*иногда зарожается через плаценту*
3)		*не страдает*

Задание №44		
Зуд, обильные творожистые выделения из половых путей у женщин характерны для:		
1)		*трихомониаза*
2)		*гонореи*
3)		*сифилиса*
4)		*хламидиоза*
5)		*кандидамикоза*

Задание №45		
Причиной остроконечных кондилом являются:		
1)		*любая инфекция*
2)		*фильтрующийся вирус*
3)		*беременность*
4)		*гонококки*

Задание №46		
К специфическим воспалительным заболеваниям гениталий относятся:		
1)		*гонорея*
2)		*туберкулез*
3)		*трихомониаз*
4)		*кондиломы*
5)		*бартолинит*

Задание №47		
Заражение бледной трепонемой происходит:		
1)		*Через неповрежденные слизистые*
2)		*Через поврежденную кожу*
3)		*При поцелуе*
4)		*При докуривании сигарет*
5)		*Через дыхательные пути*

Задание №48		
Бледная трепонема лучше сохраняется		
1)		*В холоде*
2)		*При повышении температуры до 60 градусов*

Задание №49
При сифилисе и беременности развиваются:

1)		*уродства плода*
2)		*внутриутробное поражение плода*
3)		*ухудшение состояния матери при всех формах сифилиса*
4)		*выкидыши*

Задание №50		
Учащенное, болезненное мочеиспускание, жжение, слизисто-гнойные выделения из половых путей, зависимость обострения процесса от менструального цикла характерны для:		
1)		*трихомониаза*
2)		*гонореи*
3)		*метроэндометрита*
4)		*молочницы*
5)		*сифилиса*

Задание №51		
К гонорее верхнего отдела половой системы женщины относится:		
1)		*гонорейный эндометрит*
2)		*гонорейный сальпингоофорит*
3)		*гонорейный пельвиоперитонит*
4)		*гонорейный уретрит*

Задание №52		
Восходящая гонорея - это:		
1)		*специфическое воспаление половых органов женщины, расположенных за внутреннем зевом шейки матки*
2)		*специфическое воспаление уретры, парауретральных желез, цервикального канала шейки матки*

Задание №53		
Обследованию на гонорею подлежат женщины:		
1)		*направляемые на медицинский аборт*
2)		*с бесплодием*
3)		*с эрозией шейки матки*
4)		*с хроническими воспалительными заболеваниями гениталий*
5)		*с травматической несостоятельностью мышц тазового дна*

Задание №54
Беременность при гонорее:

1)		*всегда прерывается*
2)		*не прогрессирует*
3)		*развивается без особенностей*
4)		*служит провокационным моментом*

Задание №55		
Наиболее частая локализация внелегочного туберкулеза:		
1)		*периферические лимфоузлы, перикард, кости и суставы*
2)		*мочеполовая система, костно-суставная система, периферические лимфоузлы*
3)		*глаза, центральная нервная система, мочеполовая система*

Задание №56		
Наиболее достоверные методы диагностики генитального туберкулеза:		
1)		*посев отделяемого половых путей, менструальной крови*
2)		*соскоб эндометрия*
3)		*рентгенологические исследования*
4)		*туберкулинодиагностика*

Задание №57		
Генитальный туберкулез можно заподозрить у женщины, страдающей:		
1)		*дисфункцией яичников*
2)		*первичным бесплодием*
3)		*с длительным субфебрилитетом*

Задание №58		
Женское бесплодие - это:		
1)		*отсутствие беременности в течении 2 лет нормальной половой жизни*
2)		*нарушение сексуальной функции женщины*
3)		*заболевание всего организма*
4)		*симптом заболевания*

Задание №59		
Укажите методы исследования двухфазного менструального цикла:		
1)		*измерение базальной температуры*
2)		*определение симптома "зрачка"*
3)		*кольпоцитологическое исследование*

4)		*гистеросальпингография*

Задание №60		
По выраженности волосистого покрова на лобке судят о:		
1)		*функции щитовидной железы*
2)		*проходимости маточных труб*
3)		*функции яичников*

Задание №61		
Атрезия фолликула это:		
1)		*длительное существование фолликула*
2)		*появление незрелого фолликула*
3)		*обратное развитие не созревшего фолликула*
4)		*длительное существование зрелого фолликула*

Задание №62		
Апоплексия яичника чаще бывает:		
1)		*перед месячными*
2)		*в середине менструального цикла, в дни овуляции*

Задание №63		
Продолжительность нормального менструального цикла:		
1)		*21 день*
2)		*30 дней*
3)		*40 дней*
4)		*28 дней*
5)		*от 21 до 35 дней*

Задание №64		
Укажите сомнительные признаки беременности:		
1)		*вкусовые прихоти*
2)		*увеличение молочных желез*
3)		*увеличение матки*
4)		*признак Гегара*

Задание №65		
Укажите вероятные признаки беременности		
1)		*рвота*
2)		*пигментация кожи*
3)		*прекращение менструации*

4)		*УЗИ плода*

Задание №66		
Укажите достоверный признак беременности:		
1)		*выслушивание сердцебиения плода*
2)		*признак Снегирева*
3)		*признак Пискачека*
4)		*иммунологические пробы*

Задание №67		
Ранний срок беременности можно определить по:		
1)		*УЗИ*
2)		*уровню хориального гонадотропина в утренней моче*
3)		*базальной температуре*
4)		*величине матки*

Задание №68		
Экспресс анализ на беременность заключается в определении:		
1)		*прогестерона*
2)		*гормонов гипофиза*
3)		*эстрогенных гормонов*
4)		*хорионического гонадотропина*

Задание №69		
Величина матки при 4-х недельной беременности:		
1)		*со спичечный коробок*
2)		*с куриное яйцо*
3)		*с головку новорожденного*

Задание №70		
Величина матки при 12-ти недельной беременности:		
1)		*с головку новорожденного*
2)		*с куриное яйцо*
3)		*с женский кулак*

Задание №71		
Самой частой причиной кровотечения в 1 половине беременности является:		
1)		*самопроизвольный выкидыш*
2)		*рак шейки матки*

3)		*преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты*

Задание №72		
Аборт - это:		
1)		*прерывание беременности в любые сроки*
2)		*медицинская операция*
3)		*прерывание беременности до 27 недельного срока*
4)		*метод регулирования семьи*

Задание №73		
Привычный аборт - это:		
1)		*прерывание беременности более 5 раз*
2)		*прерывание беременности 1 раз*
3)		*прерывание беременности более 3 раз*

Задание №74		
"Ранний аборт" соответствует сроку беременности:		
1)		*4-12 недель*
2)		*13-27 недель*
3)		*28-37 недель*

Задание №75		
Определение "поздний аборт" соответствует сроку беременности:		
1)		*4-12 недель*
2)		*13-27 недель*
3)		*28-37 недель*

Задание №76		
Противопоказания для выскабливания полости матки:		
1)		*III - IV степень чистоты влагалищного содержимого*
2)		*наличие острого и подострого воспаления в матке и придатках*
3)		*инфекционные заболевания любой локализации*
4)		*повышение температуры тела*
5)		*кровянистые выделения из половых путей*

Задание №77
Независимые сестринские вмешательства при обильных кровянистых выделениях из половых путей после диагностического выскабливания полости матки:

1)		*дача пузыря со льдом*
2)		*смена подкладных пеленок*
3)		*в/в введение кровоостанавливающих и сокращающих средств*

Задание №78		
После проведения операции искусственного прерывания беременности, половая жизнь разрешается:		
1)		*через 14 дней*
2)		*после очередных месячных*

Задание №79		
Стерилизация - это:		
1)		*метод контрацепции*
2)		*создание непроходимости маточных труб*
3)		*обязательный метод контрацепции*
4)		*только мужская операция*

Задание №80		
Укажите противопоказания для вставления ВМС:		
1)		*Rh-отрицательная кровь*
2)		*гипоменорея*
3)		*патология шейки матки*
4)		*миома матки*
5)		*хроническое воспаление придатков матки с частым обострением*

Задание №81		
Противопоказания для назначения гормональных - контрацептивов:		
1)		*повышения свертываемости крови*
2)		*тяжелые экстрагенитальные заболевания*
3)		*варикозное расширение вен*
4)		*гипоменорея*

Задание №82		
Осложнения гормональной контрацепции:		
1)		*гипертензия*
2)		*тромбофлебиты*
3)		*циститы*
4)		*кольпиты*

Задание №83		
Для мастопатии характерны:		
1)		*боль в молочной железе перед менструацией*
2)		*отсутствие пальпаторных образований в молочной железе*
3)		*двусторонность поражения*
4)		*наличие увеличенных подмышечных лимфоузлов*

Задание №84		
Для рака молочной железы характерны:		
1)		*наличие пальпируемого в молочной железе узла, сращенного с кожей*
2)		*увеличение региональных лимфоузлов*
3)		*втяжение соска*
4)		*появление на коже патологической морщинистости над узлом*
5)		*отсутствие увеличения подмышечных лимфоузлов*

Задание №85		
Причины маточных кровотечений в климактерическом периоде:		
1)		*гиперплазия эндометрия*
2)		*полипоз эндометрия*
3)		*аденокарцинома тела матки*
4)		*онкопатология шейки матки*
5)		*воспаление влагалища*

Задание №86		
При дисфункциональных маточных кровотечениях проводят диагностические манипуляции:		
1)		*раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала*
2)		*аспирационную биопсию*
3)		*гистероскопию*
4)		*кульдоскопию*

Задание №87		
К фоновым заболеваниям эндометрия относятся:		
1)		*простая железисто - кистозная гиперплазия эндометрия*
2)		*аденоматоз эндометрия*
3)		*аденоматозный полип эндометрия*

Задание №88		
Кровянистые выделения и боли до и после месячных характерны для:		
1)		*эндометриоза*
2)		*миомы матки*
3)		*кисты яичника*

Задание №89		
Гиперполименорея, анемия - характерны для:		
1)		*миомы матки*
2)		*эндометриоза*
3)		*кистомы яичника*

Задание №90		
Миома развивается на фоне:		
1)		*повышения выработки эстрогенов*
2)		*повышения выработки прогестерона*
3)		*снижения уровня прогестерона в крови*

Задание №91		
Приоритетные проблемы у больных с симптомной (гиперполименорея) миомой матки:		
1)		*кровотечение*
2)		*слабость, головокружение*
3)		*запоры*

Задание №92		
Наиболее злокачественно протекает рак:		
1)		*клитора*
2)		*больших и малых половых губ*

Задание №93		
У женщин чаще встречается:		
1)		*первичный рак яичников*
2)		*вторичный рак яичников*
3)		*метастатический рак яичников*

Задание №94		
К группам риска по возникновению рака яичника относятся:		
1)		*лица с миомой матки*

2)		*больные длительно лечившиеся по поводу хронических воспалительных заболеваний придатков матки и яичников*
3)		*больные, в прошлом оперированные по поводу кист яичников*
4)		*больные, с нарушением менструальной функции*
5)		*больные, с нарушением репродуктивной функции*
6)		*больные, ранее лечившиеся по поводу злокачественных новообразований яичника*
7)		*больные, имеющие в анамнезе гонорею*

Задание №95		
Более часто из кист яичников озлокачествляется:		
1)		*серозная киста*
2)		*дермоидная киста*

Задание №96		
Основным этиологическим фактором в возникновении злокачественных опухолей яичников является:		
1)		*гонадотропная гиперстимуляция яичников*
2)		*повышение секреции гормона желтого тела*

Задание №97		
Предраковые заболевания шейки матки - это:		
1)		*дисплазии II - III степени.*
2)		*аденоматозный полип*
3)		*атипическая лейкоплакия*
4)		*эрозии, эндоцервициты*

Задание №98		
Вероятный сестринский диагноз у больной с распадающейся опухолью шейки матки:		
1)		*кровотечение*
2)		*боль*
3)		*гнойные выделения из половых путей*

Задание №99		
Основным клиническим признаком при раке маточных труб является:		
1)		*появление мутных белей из половых путей*
2)		*появление из половых путей белей янтарного цвета*

Задание №100

Подготовка гинекологической больной к общей операции включает:		
1)		*очистительные клизмы вечером перед операцией и утром в день операции*
2)		*накануне и в день операции утром (димедрол, нозепам или сибазон)*
3)		*гигиенический душ вечером перед операцией*
4)		*утром после очистительной клизмы - подмывают*
5)		*премедикация за 40 минут до операции (димедрол, атропин, промедол)*
6)		*выводят мочу катетером*
7)		*обрабатывают влагалище фурациллином*

Задание №101		
В послеоперационном периоде палатная медсестра должна следить за:		
1)		*дыханием*
2)		*пульсом*
3)		*состоянием повязки*
4)		*выделениями из влагалища*
5)		*почасовым диурезом*

Задание №102		
Положение больного в постели до выхода из наркоза:		
1)		*Фовлера*
2)		*Тренделенбурга*
3)		*горизонтальное на спине, голова на подушке, повернута на бок*
4)		*горизонтальное на спине без подушки, голова повернута на бок*
5)		*ноги приподняты, голова опущена*

Задание №103		
Борьба с метеоризмом после операции:		
1)		*гипертоническая клизма*
2)		*сифонная клизма*
3)		*газоотводная трубка*
4)		*дыхательная гимнастика*
5)		*голод*
6)		*эспумизан, активированный уголь*

Задание №104		
Пузырь со льдом на низ живота после малых гинекологических операций кладут:		
1)		*на 2 часа по 15 минут с промежутками в 5 минут*
2)		*на 1 час постоянно*

Задание №105		
После операции можно давать воду:		
1)		*через 1 час*
2)		*через 4 часа*
3)		*через 6 часов*

Задание №106		
Независимые сестринские вмешательства при подготовке больной к влагалищному спринцеванию:		
1)		*подготовка инструментария*
2)		*контроль за температурой растворов, используемых для спринцевания*
3)		*спринцевание тем или иным раствором по назначению врача*

Задание №107		
Для влагалищных спринцеваний применяют жидкости:		
1)		*антисептические*
2)		*вяжущие*
3)		*щелочные*
4)		*кровоостанавливающие*

Задание №108		
На курс лечения влагалищных спринцеваний нужно:		
1)		*5-6 процедур*
2)		*10 - 12 процедур*
3)		*20 процедур*

Задание №109		
Продолжительность влагалищного душа:		
1)		*10 минут*
2)		*10-25 минут*

3)		*30 минут*

Задание №110		
Продолжительность влагалищной ванночки:		
1)		*10 минут*
2)		*15 минут*
3)		*30 минут*

Задание №111		
Активная первичная хирургическая обработка включает:		
1)		*удаление попавших в рану микроорганизмов путем иссечения ее краев или рассечения тканей*
2)		*удаление всех поврежденных тканей, сгустков крови*
3)		*перевод всех видов ран в резаные для ускорения процессов регенерации*
4)		*тщательный полный и окончательный гемостаз*
5)		*при необходимости наложение швов и дренирование раны*

Задание №112		
Первые симптомы инфицирования послеоперационной раны:		
1)		*кровотечение*
2)		*местное повышение температуры*
3)		*отек*
4)		*гиперемия*
5)		*гнойное отделяемое*

Задание №113		
Общие признаки острой хирургической инфекции:		
1)		*ускорение СОЭ*
2)		*повышение температуры тела*
3)		*головная боль*
4)		*гиперемия*
5)		*отек*

Задание №114		
Местные признаки острой хирургической инфекции:		
1)		*отек,*
2)		*гиперемия*

3)		*повышение температуры тела*
4)		*боль при пальпации*
5)		*лейкоцитоз*

Задание №115		
Для постинъекционного абсцесса характерны:		
1)		*припухлость, гиперемия кожи*
2)		*симптом флюктуации*
3)		*повышение температуры*
4)		*боль в зоне абсцесса*
5)		*симптом "лимонной корки"*

Задание №116		
При исследовании отделяемого раны на микрофлору:		
1)		*обработку раны проводить нельзя*
2)		*отбирается гнойное отделяемое*
3)		*отделяемое раны забирается стерильным тампоном в сухую стерильную пробирку*
4)		*до передачи в баклабораторию отобранный материал хранится в холодильнике в перевязочном кабинете*
5)		*отобранный сухим стерильным тампоном материал доставляется в баклабораторию в течение 2х часов*
6)		*перед забором отделяемого из раны проводится обработка раны, убирается гной, корочки*
7)		*направление тампона при заборе материала - от центра к периферии*
8)		*направление тампона при заборе материала - круговое*

Задание №117		
Профилактика тромбоэмболии в стационаре:		
1)		*максимально возможная активность мышц нижних конечностей пациентов, находящихся на длительном постельном режиме*
2)		*фибринолизин*
3)		*фибрин*
4)		*гепарин натрия*
5)		*аспирин*
6)		*варфарин*

7)		*эластическая компрессия нижних конечностей до, во время и после определённых инвазивных вмешательств*

Задание №118		
Для острого гнойного послеродового мастита характерны:		
1)		*высокая лихорадка*
2)		*боль в области молочной железы*
3)		*пальпаторное определение в молочной железе участка уплотнения с флюктуацией*
4)		*уменьшение лактации*
5)		*гнойные выделения из соска*

Задание №119		
Гепарин натрия вводят:		
1)		*внутримышечно в дельтовидную мышцу каждые 6 часов в течение суток*
2)		*под кожу живота, интервал между инъекциями 8 часов*
3)		*в плановой хирургии первая инъекция проводится за 2 часа до операции*
4)		*в плановой хирургии первая инъекция проводится через 2 часа после операции*
5)		*в зкстренной хирургии первая инъекция проводится не позже 12 часов после операции*
6)		*в зкстренной хирургии первая инъекция проводится во время операции*

Задание №120		
Факторами высокого риска возникновения ТЭЛА является:		
1)		*тромбоз глубоких вен нижних конечностей*
2)		*тромбоз глубоких вен рук*
3)		*тромбоэмболия в анамнезе*
4)		*варикозное расширение вен*
5)		*сахарный диабет*
6)		*расширенные оперативные вмешательства на органах брюшной полости*
7)		*возраст старше 45лет*
8)		*аппендэктомия, грыжесечение*
9)		*тромбофилии*

Задание №121		
Ранние симптомы ТЭЛА:		
1)		*одышка*
2)		*боль в груди*
3)		*кровохарканье*
4)		*отеки*
5)		*изменение в общем анализе крови*

Задание №122		
Синдром "острого живота" в гинекологии возникает при:		
1)		*прервавшейся внематочной беременности по типу разрыва маточной трубы*
2)		*апоплексии яичника*
3)		*перекруте ножки опухоли яичника*
4)		*перекруте ножки фиброматозного узла*
5)		*прерывавшейся внематочной беременности по типу трубного выкидыша*

Задание №123		
Прервавшуюся внематочную беременность нужно дифференцировать с:		
1)		*апоплексией яичника*
2)		*острым аппендицитом*
3)		*дисфункциональным маточным кровотечением*
4)		*самопроизвольным выкидышем*
5)		*эндометриозом*

Задание №124		
К терминальным состояниям относятся:		
1)		*предагональное состояние*
2)		*кома*
3)		*шок*
4)		*агония*
5)		*клиническая смерть*
6)		*биологическая смерть*

Задание №125
Тремя главными признаками клинической смерти являются:

1)		*отсутствие пульса на лучевой артерии*
2)		*отсутствие пульса на сонной артерии*
3)		*отсутствие сознания*
4)		*отсутствие дыхания*
5)		*расширение зрачков*
6)		*цианоз*

Задание №126

Максимальная продолжительность клинической смерти в обычных условиях составляет:

1)		*10-15 минут*
2)		*5-6 минут*
3)		*2-3 минуты*
4)		*1-2 минуты*

Задание №127

К ранним симптомам биологической смерти относятся:

1)		*помутнение роговицы*
2)		*трупное окоченение*
3)		*трупные пятна*
4)		*расширение зрачков*
5)		*деформация зрачков*

Задание №128

Проведение НМС у взрослых:

1)		*ладони следует расположить на нижней трети грудины*
2)		*ладони следует расположить на границе средней и нижней трети грудины*
3)		*всей ладонной поверхностью кисти, руки согнуты в локтях*
4)		*проксимальной частью ладони в области запястья, руки прямые*
5)		*положение больного должно быть удобным для него*
6)		*больной должен лежать на твердой ровной поверхности*
7)		*соотношение "вентиляция:массаж"2:30*
8)		*соотношение "вентиляция:массаж"2:12-15*

Задание №129

Признаками эффективности проводимой реанимации являются:		
1)		*пульсация на сонной артерии во время массажа сердца*
2)		*движения грудной клетки во время ИВЛ*
3)		*уменьшение цианоза*
4)		*сужение зрачков*
5)		*расширение зрачков*

Задание №130		
Эффективная реанимация продолжается:		
1)		*5 минут*
2)		*15 минут*
3)		*30 минут*
4)		*до 1 часа*
5)		*до восстановления жизнедеятельности*

Задание №131		
Неэффективная реанимация продолжается:		
1)		*5 минут*
2)		*15 минут*
3)		*30 минут*
4)		*до 1 часа*
5)		*до восстановления жизнедеятельности*

Задание №132		
Абсолютные признаки переломов костей:		
1)		*болезненная припухлость в зоне травмы*
2)		*патологическая подвижность*
3)		*кровоизлияние в зоне травмы*
4)		*укорочение или деформация конечности*
5)		*костная крепитация*
6)		*показания рентгеновского снимка*

Задание №133		
Характерные симптомы черепно-мозговой травмы:		
1)		*потеря сознания в момент травмы*
2)		*возбужденное состояние после восстановления сознания*
3)		*головная боль, головокружение после восстановления сознания*

4)		*ретроградная амнезия*
5)		*судороги*

Задание №134		
Для синдрома длительного сдавления характерно:		
1)		*отсутствие движений в пораженных конечностях*
2)		*плотный отек мягких тканей*
3)		*боль в пораженных конечностях*
4)		*цианоз кожи дистальнее границы сдавления*

Задание №135		
Максимальное время наложение жгута зимой и летом при чрезвычайных ситуациях:		
1)		*1 час*
2)		*30 минут*
3)		*2 часа*
4)		*15 минут*
5)		*без временных ограничений*

Задание №136		
Артериальный жгут накладывается:		
1)		*При артериальном кровотечении с повреждением крупной артерии выше раны и как можно ближе к ней*
2)		*При артериальном кровотечении ниже раны и как можно дальше от нее*

Задание №137		
Положение больного с носовым кровотечением:		
1)		*Сидя, запрокинув голову*
2)		*Горизонтальное положение на спине*
3)		*Сидя, слегка опустив голову*

Задание №138		
Если у больного получившего электротравму отсутствует сознание, но нет видимых расстройств дыхания и кровообращения, медсестра должна:		
1)		*сделать внутримышечно кордиамин и кофеин*
2)		*дать понюхать нашатырный спирт*
3)		*расстегнуть одежду*
4)		*уложить больного на бок*

5)		*вызвать врача*
6)		*начать ингаляцию кислорода*

Задание №139		
В дореактивном периоде отморожения характерны:		
1)		*бледность кожи*
2)		*отсутствие чувствительности кожи*
3)		*боль*
4)		*чувство онемения*
5)		*гиперемия кожи*
6)		*отек*

Задание №140		
Помощь пострадавшему в дореактивном периоде обморожения включает:		
1)		*Горячее питье, наложение теплоизолирующей повязки на конечности, срочная госпитализация*
2)		*Дать алкоголь, конечность поместить в горячую воду, срочно госпитализировать*
3)		*Срочно госпитализировать, обложив больного грелками*

Задание №141		
На обожженную поверхность накладывается:		
1)		*повязка с фурациллином*
2)		*повязка с синтомициновой эмульсией*
3)		*сухая стерильная повязка*
4)		*повязка с раствором чайной соды*

Задание №142		
Охлаждение обожженной поверхности холодной водой показано:		
1)		*В первые минуты после травмы*
2)		*только при ожоге 1 степени*
3)		*не показано*

Задание №143		
Ранние признаки теплового удара:		
1)		*общая слабость, разбитость*
2)		*головная боль*
3)		*тошнота*
4)		*бред, галлюцинации, потеря сознания*

5)		*температура тела 39-40 градусов*

Задание №144		
Первая помощь при тепловом ударе:		
1)		*перенести пострадавшего в прохладное место*
2)		*холодный компресс на голову*
3)		*прием жидкости*
4)		*ИВЛ, НМС*
5)		*в/в введение кордиамина и кофеина*

Задание №145		
Острая сосудистая недостаточность характеризуется:		
1)		*Внезапным подъемом АД*
2)		*Внезапным падением АД*
3)		*Болями за грудиной*
4)		*Головными болями*
5)		*Головокружением*

Задание №146		
Первая помощь при обмороке:		
1)		*освободить от стесняющей одежды*
2)		*дать доступ свежего воздуха*
3)		*дать нитроглицерин*
4)		*придать положение с низким изголовьем*
5)		*ингаляция паров нашатырного спирта*

Задание №147		
Клиническая картина при прободной язве желудка и 12-ти перстной кишки:		
1)		*внезапная "кинжальная" боль в эпигастральной области*
2)		*бледность кожных покровов, холодный пот*
3)		*пульс слабый*
4)		*низкое артериальное давление*
5)		*высокое артериальное давление*

Задание №148		
Факторами, провоцирующими гипертонические кризы, являются:		
1)		*стресс*
2)		*прием алкоголя*

3)		*метеофакторы*
4)		*прекращение гипотензивной терапии*
5)		*прием жидкости*
6)		*переохлаждение*

Задание №149		
Характерные симптомы повышения артериального давления:		
1)		*головная боль, головокружение, боли в сердце, тошнота*
2)		*озноб, головная боль, боли в мышцах*
3)		*слабость, головная боль, рвота, приносящая облегчение*
4)		*головная боль, боли в грудной клетке, усиливающиеся при дыхании, мушки перед глазами*
5)		*носовое кровотечение*

Задание №150		
Для типичного приступа стенокардии характерны:		
1)		*загрудинная локализация боли*
2)		*продолжительность боли в течение 15-20 минут*
3)		*продолжительность боли в течение 30-40 минут*
4)		*продолжительность боли в течение 3-5 минут*
5)		*эффект от нитроглицерина*
6)		*иррадиация боли в левую руку, лопатку, нижнюю челюсть*
7)		*боль приступообразная, колющая*
8)		*ощущение жжения, сжатия в области сердца*

Задание №151		
Главным признаком типичного инфаркта миокарда является:		
1)		*холодный пот и резкая слабость*
2)		*брадикардия или тахикардия*
3)		*низкое АД*
4)		*боль за грудиной продолжительностью более 20 минут*

Задание №152		
У больного с инфарктом миокарда в остром периоде могут развиться следующие осложнения:		
1)		*шок*
2)		*острая сердечная недостаточность*

3)		*ложный острый живот*
4)		*остановка кровообращения*
5)		*реактивный перикардит*

Задание №153		
Для приступа бронхиальной астмы характерными симптомами являются:		
1)		*очень частое дыхание*
2)		*вдох значительно длиннее выдоха*
3)		*выдох значительно длиннее вдоха*
4)		*заостренные черты лица, спавшиеся вены шеи*
5)		*одутловатое лицо, напряженные вены шеи*

Задание №154		
Для диабетической комы характерны симптомы:		
1)		*сухость кожи*
2)		*редкое дыхание*
3)		*частое шумное дыхание*
4)		*запах ацетона в выдыхаемом воздухе*
5)		*твердые глазные яблоки*
6)		*румянец щёк*
7)		*размягчённые глазные яблоки*

Задание №155		
Для гипогликемического состояния характерны:		
1)		*вялость и апатия*
2)		*возбуждение*
3)		*сухость кожи*
4)		*потливость*
5)		*повышение мышечного тонуса*
6)		*снижение мышечного тонуса*
7)		*тремор конечностей*
8)		*головокружение*

Задание №156
При гипогликемическом состоянии у больного, если больной в сознании, медсестра должна:

1)		*ввести в/м преднизолон*
2)		*ввести в/м инсулин*
3)		*дать внутрь сладкое питье,*
4)		*дать внутрь продукты, содержащие сахар*
5)		*дать внутрь солянощелочной раствор*

Задание №157

Первоочередным мероприятием при анафилактическом шоке является:

1)		*введение антигистаминных препаратов*
2)		*наложение жгута*
3)		*в/в введение преднизолона и адреналина*
4)		*пузырь со льдом в место инъекции*
5)		*прекращение введения препарата*

Задание №158

ВИЧ теряет вирулентность при кипячении в течение:

1)		*60 секунд*
2)		*30 мин*
3)		*45 мин.*
4)		*60 мин.*

Задание №159

Время сохранения вирулентности ВИЧ в капле крови при комнатной температуре составляет:

1)		*20 минут*
2)		*несколько часов*
3)		*4-6 суток*
4)		*6 месяцев*

Задание №160

У 90-95% ВИЧ-инфицированных антитела к ВИЧ появляются через:

1)		*3 недели*
2)		*3 месяца*
3)		*6 месяцев*
4)		*12 месяцев*

Задание №161

Самый ранний срок появления антител в организме ВИЧ- инфицированного после заражения составляет:		
1)		*2 дня*
2)		*1 нед.*
3)		*2 нед.*
4)		*3 мес.*

Задание №162		
Обеззараживание рук при загрязнении их кровью нужно провести следующим образом:		
1)		*обработать тампоном, смоченным 96 % спиртом*
2)		*вымыть под теплой проточной водой с мылом, просушить полотенцем и обработать 70 % спиртом*
3)		*обработать кожу тампоном, смоченным 70 % спиртом, вымыть с мылом под теплой проточной водой, просушить полотенцем и повторно обработать 70% спиртом*
4)		*вымыть водой с мылом, просушить полотенцем, обработать тампоном, смоченным 3%раствором хлорамина*

Задание №163		
При попадании крови в полость рта медицинского работника нужно прополоскать рот:		
1)		*раствором фурацилина*
2)		*большим количеством воды, затем 70% спиртом*
3)		*96% спиртом*
4)		*проточной водой, затем 0,05% р-ром перманганата калия*

Задание №164		
Профилактику ВИЧ-инфекции при порезе или уколе кожи медицинского работника инструментом, загрязненным кровью, следует провести следующим образом:		
1)		*промыть проточной водой с мылом, снять перчатку, обработать ранку 5% йодом*
2)		*снять перчатку, вымыть руку с мылом под теплой проточной водой, высушить полотенцем, обработать ранку 70% спиртом, затем 5% раствором йода*
3)		*выдавить кровь, вымыть руку с мылом под проточной водой, снять перчатку, обработать ранку 70% спиртом*

Задание №165

При попадании крови в глаза медицинского работника нужно промыть:		
1)		*раствором фурацилина*
2)		*большим количеством воды, не тереть*
3)		*каплями с антибиотиками*
4)		*0.05% р-ром перманганата калия*

Задание №166
Лица, имевшие половой или медицинский контакт с больным ВИЧ-инфекцией, проходят клинико-лабораторное обследование:

1)		*при выявлении, через 1,5; 3; 6; 12 месяцев*
2)		*через 3, б, 12 месяцев*
3)		*при выявлении, через 1; 3; 6; 9; 12 месяцев*
4)		*через 3; 6; 9; 12; 18; 24 месяца*

Задание №167
Кто по эпидемиологическим показаниям должен прививаться против гепатита В (различные схемы):

1)		*больные гемофилией*
2)		*больные, находящиеся на гемодиализе*
3)		*медицинские работники*
4)		*новорожденные в первые 24 часов жизни*
5)		*дети, родившиеся от инфицированных ВИЧ, ВГВ, ВГС женщин*
6)		*население от 18 до 55 лет*

Задание №168
Характерные клинические признаки гриппа:

1)		*явления общей интоксикации*
2)		*повышенная потливость*
3)		*конъюнктивит*
4)		*гнойное отделяемое из носа*
5)		*трахеит,трахеобронхит*
6)		*пневмония*
7)		*лицо красное, одутловатое, глаза красные*
8)		*бледный носогубный треугольник*

Задание №169
Что из перечисленного является резервуаром инфекции при сыпном тифе:

1)		*платяная вошь*
2)		*больной болезнью Брилла*
3)		*риккетсия Провачека*
4)		*головная вошь*

Задание №170		
Выберите верное утверждение:		
1)		*зеркалом чесотки являются кисти рук*
2)		*зуд при чесотке усиливается в тепле*
3)		*обработка больного проводится на ночь*
4)		*у взрослых больных чесоткой не поражается лицо и спина*
5)		*смена постельного и нательного белья, мытье больного не обязательно*
6)		*в приемном отделении не имеют право отказать больному с чесоткой в госпитализации по основному заболеванию*
7)		*чесоточные ходы обусловлены жизнедеятельностью самки чесоточного клеща*
8)		*следы расчесов на коже внизу живота, внутренних поверхностей бедер - главный признак чесотки*

Задание №171		
Дайте определение термину "асептика":		
1)		*Комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на ликвидацию микроорганизмов в ране и в организме в целом*
2)		*Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение проникновения микроорганизмов в рану и в организм целом*

Задание №172		
Дайте определение термину "антисептика":		
1)		*Комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на ликвидацию микроорганизмов в ране и в организме в целом*
2)		*Комплекс мероприятий направленных на предупреждение проникновения микроорганизмов в рану и в организм в целом*

Задание №173

Стерилизации подвергаются изделия медназначения, контактирующие с:		
1)		*слизистыми оболочками*
2)		*раневыми поверхностями*
3)		*кровью*
4)		*кожными покровами*
5)		*инъекционными препаратами*

Задание №174		
Обеззараживание - это:		
1)		*уничтожение условно-патогенных микробов*
2)		*уничтожение патогенных микробов*
3)		*уничтожение споровых микроорганизмов*
4)		*все ответы верны*

Задание №175		
Факторы, влияющие на эффективность дезинфекции:		
1)		*концентрация дезинфектанта*
2)		*устойчивость микробов к дезинфектанту*
3)		*степень загрязнения объекта биоматериалом*
4)		*способ дезинфекционной обработки*
5)		*время воздействия препарата*

Задание №176		
Азопирамовую пробу можно использовать с момента приготовления в течение:		
1)		*30 мин*
2)		*1-2 ч*
3)		*рабочей смены*
4)		*суток*

Задание №177		
Азопирамовый реактив может храниться в холодильнике в течение:		
1)		*1 мес*
2)		*2 мес*
3)		*до окончания количества реактива*

Задание №178		
Умеренное пожелтение реактива в процессе хранения без выпадения осадка:		
1)		*не снижает его рабочих качеств*

2)		*снижает качество реактива*

Задание №179		
Положительная реакция на наличие скрытой крови азопирамом дает:		
1)		*розовое окрашивание*
2)		*фиолетовое окрашивание, переходящее в розово-сиреневое или бурое*
3)		*сиренево-фиолетовое окрашивание*
4)		*сине-фиолетовое окрашивание*

Задание №180		
Результаты реакции на скрытую кровь учитываются в течение:		
1)		*до 1 минуты*
2)		*до 3 минут*
3)		*до 30 секунд*
4)		*время не ограничивается*

Задание №181		
Азопирамовая проба реагирует на остатки:		
1)		*крови*
2)		*гноя*
3)		*хлора*
4)		*моющего средства с отбеливателем*
5)		*ржавчины*

Задание №182		
Пригодность рабочего раствора азопирама проверяют нанесением:		
1)		*2х - 3х капель раствора на кровяное пятно*
2)		*2-3 капель раствора на ватный шарик с СМС*
3)		*2-3 капель раствора на хлорсодержащее дезсредство*

Задание №183		
Объекты стерилизации при паровом методе стерилизации:		
1)		*изделия из металла, стекла*
2)		*резиновые перчатки*
3)		*текстильный материал*
4)		*изделия из полимерных материалов*
5)		*только изделия из х/бумажной ткани*

Задание №184		
Виды контроля качества стерилизации при паровом методе:		
1)		*бактериологический*
2)		*биологический*
3)		*химический*
4)		*физический*

Задание №185		
Сроки хранения стерильности медицинских изделий без упаковки при вскрытии бикса:		
1)		*10 дней*
2)		*7 дней*
3)		*3 дня*
4)		*1 день*

Задание №186		
Изделия из резины стерилизуются при режиме:		
1)		*120С - 45-минут*
2)		*132С - 20 минут*
3)		*134С - 5 минут*
4)		*126С - 10 минут*
5)		*110С - 180 минут*
6)		*121С - 20 минут*

Задание №187		
Срок хранения изделий простерилизованных в 2-х слойной мягкой упаковке из крепированной бумаги:		
1)		*20 суток*
2)		*1 год*

Задание №188		
Срок хранения изделий простерилизованных в однослойном прозрачном или комбинированном пакете <СТЕРИКИНГ>:		
1)		*до 1 года*
2)		*20 суток*
3)		*1 месяц*

Задание №189
Срок хранения стерильности изделий простерилизованных в биксах без фильтра:

1)		*3 суток*
2)		*1 день*
3)		*20 суток*

Задание №190		
Требуемое количество тестов, закладываемых в биксы:		
1)		*1*
2)		*3*
3)		*5*

Задание №191		
Химический контроль за работой самих паровых стерилизаторов проводится с помощью:		
1)		*термовременных индикаторов 1 класса*
2)		*термовременных индикаторов 4 класса (стеритест, стериконт)*

Задание №192		
Химические вещества для контроля стерильности при воздушном методе ставятся (при объеме камеры до 80 куб. дм.):		
1)		*в 5 точках*
2)		*в 3 точках*
3)		*на одной полке*

Задание №193		
Воздушный метод стерилизации проводится в:		
1)		*открытом виде - без упаковки*
2)		*крафт - пакетах*
3)		*мешочной непропитанной бумаге*
4)		*мешочной влагопрочной бумаге*
5)		*упаковке из хлопчатобумажной ткани*
6)		*упаковка высокой прочности*
7)		*упаковка из крепированной бумаги*

Задание №194		
Изделия, простерилизованные воздушным или паровым методом, в упаковке из крепированной бумаги:		
1)		*могут храниться 3суток*
2)		*используются в течение суток*

3)		*хранятся до 20 суток*

Задание №195		
Химический контроль за паровой стерилизацией материала проводится с помощью:		
1)		*стеритеста П*
2)		*стериконта П*
3)		*стеритеста В*
4)		*стериконта В*
5)		*ИНТЕСТа*

Задание №196		
Воздушный метод стерилизации применяется для изделий из:		
1)		*металла*
2)		*хлопчатобумажной ткани*
3)		*стекла*
4)		*силиконовой резины*

Задание №197		
Режим паровой стерилизации изделий из латекса:		
1)		*120С - 45 минут*
2)		*121С - 20 минут*

Задание №198		
Требуемое количество тестов при контроле за работой воздушного стерилизатора с объемом свыше 80 дм3:		
1)		*3*
2)		*5*
3)		*15*

Задание №199		
Режим паровой стерилизации для изделий из коррозионностойкого металла:		
1)		*134С - 5 минут*
2)		*132С - 20 минут*
3)		*126С - 10 минут*

Задание №200		
Режим паровой стерилизации изделий из текстиля:		
1)		*134С - 5 минут*

2)		*132С - 20 минут*
3)		*126С - 10 минут*