

19.1 Для медицинских сестер врача общей практики (усовершенствование)

#Клинические симптомы острой почечной недостаточности:

- запах аммиака
- кожа сухая, расчесы
- гиперазотемия
- гиперкетонурия
- кожа влажная, румянец на щеках
- запах ацетона

#Медикаментозное лечение печеночной комы предполагает введение:

- 10% раствора глюкозы в/в капельно
- инъекции эссенциале
- витамины группы В
- анальгин
- морфин

#Основные клинические симптомы печеночной комы:

- геморрагии на коже
- печеночный запах изо рта
- желтуха
- запах мочевины изо рта
- запах ацетона изо рта

#Симптомы острой сосудистой недостаточности:

- малый пульс
- низкое АД
- бледность кожных покровов
- гиперемия кожных покровов
- напряженный пульс

#Коллапс как осложнение возникает при:

- интоксикации
- кровопотерях
- инфаркте миокарда
- гипертензии
- бронхиальной астме

#Симптомы острой правожелудочковой недостаточности:

- выраженный цианоз лица, шеи
- набухание шейных вен
- увеличение печени
- розовая пена на губах

-клокочущее дыхание

#Причины правожелудочковой недостаточности:

- тромбоэмболия легочной артерии
- бронхиальная астма
- эмфизема легких
- гипертонический криз
- острый гломерулонефрит

#Сестринское вмешательство при острой левожелудочковой недостаточности:

- создать положение ортопноэ
- жгуты на конечности
- введение пеногасителей
- использование карманного ингалятора
- форсированный диурез

#Клинические симптомы отека легкого:

- приступ удушья
- клокочущее дыхание
- розовая пена изо рта
- вязкая стекловидная мокрота
- боли в области сердца

#Клинические симптомы сердечной астмы:

- инспираторное удушье
- цианоз
- положение ортопноэ
- экспираторное удушье
- гиперемия кожных покровов

#Причины острой левожелудочковой недостаточности:

- гипертонический криз
- инфаркт миокарда
- приобретенные пороки сердца
- тромбоэмболия легочной артерии
- хроническая пневмония

#Сестринское вмешательство при острой коронарной недостаточности:

- горчичники на область сердца
- придать удобное положение
- нитроглицерин под язык
- жгуты на конечности
- горчичники на область затылка

#Симптомы острой коронарной недостаточности:

- сжимающие давящие боли
- локализация болей за грудиной
- иррадиация болей в левую руку, в левую лопатку
- иррадиация болей в правую руку
- ноющие боли в области верхушки сердца

#Причины острой коронарной недостаточности:

- спазм коронарных сосудов
- тромбоз коронарных артерий
- миокардиты
- пороки сердца

#Побочные действия длительного приема глюкокортикоидных препаратов:

- синдром Иценко-Кушинга
- эрозии, язвы желудка
- образование стрий на бедрах
- постоянная лихорадка
- снижение массы тела

#Клинические симптомы тиреотоксикоза:

- экзофтальм
- тахикардия
- брадикардия
- гипотония
- влажная кожа

#Клинические симптомы при приступе бронхиальной астмы:

- экспираторное удушье
- цианоз
- свистящие сухие хрипы
- вынужденное полусидячее положение
- инспираторное удушье
- влажные хрипы

#Клинические симптомы сахарного диабета:

- жажда
- полиурия
- повышенный аппетит
- зуд кожи
- олигурия
- одышка

#Клинические симптомы хронической почечной недостаточности:

- сухость кожных покровов
- кожный зуд, расчесы
- гиперазотемия
- влажные кожные покровы
- кетонурия

#Клинические симптомы гипертонического криза:

- резкая головная боль, головокружение
- неадекватное поведение
- тошнота, рвота
- мелькание мушек перед глазами
- одышка в покое
- сжимающие боли за грудиной
- ржавая мокрота

#Симптомы ревматоидного артрита:

- утренняя скованность
- боли и деформация мелких суставов
- ограничение движений
- летучесть суставных болей
- отсутствие деформации суставов
- эндокардит

#Клинические симптомы ревматизма:

- поражение крупных суставов
- симметричность, "летучесть" болей
- отсутствие деформации суставов
- поражение сердца
- формирование деформации суставов
- поражение мелких суставов

#Факторы риска гипертонической болезни:

- стрессы
- ожирение
- гиподинамия
- гиперхолестеринемия
- алкоголь
- аллергия
- переохлаждение

#Предвестники гипогликемической комы:

- чувство голода
- влажная кожа

- тремор конечностей
- запах ацетона изо рта
- мягкие глазные яблоки

#Сестринское вмешательство при судорогах:

- предотвращение травм
- введение противосудорожных средств
- предотвращение прикуса языка
- создание положения ортопноэ
- подготовить к введению антигистаминные средства

#Сестринское вмешательство при легочном кровотечении:

- создать полусидячее положение
- применить холод на грудную клетку
- подготовить к введению кровоостанавливающие средства
- применить грелку на грудную клетку
- подготовить к введению антиагреганты

#Планирование сестринского ухода при кори:

- постельный режим в остром периоде
- обильное витаминизированное питье
- туалет кожи и слизистых
- мониторинг жизненных функции
- обработка элементов сыпи спиртовым р-ром бриллиантового зеленого
- форсированный диурез

#Основные симптомы кори:

- пятна Филатова-Коплика
- ринит
- конъюнктивит
- пятнисто-папулезная, крупная сыпь
- ангина
- мелкоточечная сыпь на гиперемизированном фоне

#Планирование сестринского ухода при скарлатине:

- постельный режим в остром периоде
- туалет кожи, слизистых
- мониторинг жизненных функций
- контроль анализов мочи
- обработка элементов сыпи раствором перманганата калия
- провести бициллинопрофилактику

#Основные симптомы скарлатины:

- ангина

- малиновый язык
- мелкоточечная сыпь на гиперемизированном фоне
- крупно-точечная сыпь на обычном фоне
- энантема

#Планирование сестринского ухода при менингококковой инфекции:

- строгий постельный режим
- туалет кожи, слизистых
- мониторинг жизненных функций
- введение больших доз антибиотиков
- контроль за бактерионосительством
- введение антитоксической сыворотки
- ограничение питья

#Основные симптомы менингококцемии:

- выраженная бледность кожных покровов
- неукротимая рвота
- потеря сознания
- геморрагическая, звездчатая сыпь
- мелкоточечная сыпь на гиперемизированном фоне
- экзофтальм

#Планирование сестринского ухода при коклюше в спазматическом периоде:

- освобождение дыхательных путей от слизи
- оксигенотерапия
- туалет кожи, слизистых
- мониторинг жизненных функций
- применение диуретиков
- применение отхаркивающей микстуры

#Основные симптомы коклюша:

- спазматический кашель
- язвочка на уздечке языка
- увеличение околоушных слюнных желез
- боль при жевании
- склерит

#Основные симптомы эпидемического паротита:

- увеличение околоушных слюнных желез
- боль при жевании
- спазматический кашель
- налеты на миндалинах

- увеличение затылочных лимфоузлов
- орхит

#Основные симптомы дифтерии зева:

- трудноотделяемые налеты в зеве
- увеличение подчелюстных лимфоузлов
- увеличение затылочных лимфоузлов
- спазматический кашель
- увеличение околоушных слюнных желез
- отек подкожно-жировой клетчатки

#Клинические симптомы стенокардии:

- боли за грудиной (жгучие, давящие) в теч. 3-5 минут
- боли, возникающие после физической нагрузки
- боли, купирующиеся нитроглицерином
- колющие боли в области левого соска
- длительные боли, не купирующиеся нитроглицерином

#Сестринское вмешательство при приступе стенокардии:

- дать нитроглицерин под язык
- поставить горчичники на область сердца
- освободить от стесняющей одежды
- ввести наркотические средства
- ввести сердечные гликозиды

#Клинические симптомы инфаркта миокарда.

- интенсивные боли за грудиной, не купирующиеся нитроглицерином
- длительные боли за грудиной более 2-х часов
- снижение АД
- колющие боли в области сердца
- дизурия

#Симптомы, характерные для механической непроходимости кишечника:

- схваткообразные боли в животе
- рвота
- кровь в испражнениях
- отсутствие стула
- ноющие боли в животе
- гипертермия

#Сестринское вмешательство при желудочном кровотечении:

- применение пузыря со льдом
- подготовка к введению аминокапроновой кислоты
- строгий постельный режим, голод

- в/в введение адреналина
- применение грелки
- введение обезболивающих

#Симптомы злокачественных новообразований молочной железы :

- кожа в виде "лимонной корочки"
- втянутый сосок
- кровянистые выделения из соска
- метастазы в подмышечных лимфоузлах
- наличие подвижного образования
- постоянная пульсирующая боль
- гипертермия кожи

#Сестринское вмешательство при инфаркте миокарда:

- обеспечить строгий постельный режим
- мониторинг состояния (АД, пульс, ЭКГ)
- подготовить к введению наркотические анальгетики
- подготовить к введению сердечные гликозиды
- подготовить к введению кровоостанавливающие средства

#Клинические симптомы гипотиреоза:

- тахикардия
- экзофтальм
- влажная кожа
- одутловатость лица
- брадикардия
- гипотония
- снижение основного обмена

#Признаки передозировки сердечных гликозидов:

- тошнота
- экстрасистолия
- брадикардия
- тахикардия
- гематурия

#Потенциальные проблемы пациентов с язвенной болезнью:

- кровотечение
- перфорация
- малигнизация
- гипертензия
- хронический гепатит

#Признаки желудочного кровотечения:

- прогрессивное падение АД
- рвота "кофейной гущей"
- дегтеобразный стул
- снижение гемоглобина крови
- повышение температуры
- повышение АД

#Клинические симптомы гиперацидного гастрита:

- изжога
- боли в эпигастрии после еды
- опоясывающие боли
- ночные голодные боли

#К предраковым заболеваниям желудка относятся:

- язвенная болезнь желудка
- анацидные гастриты
- полипы слизистой желудка
- гиперацидный гастрит
- стеноз привратника желудка

#Сестринское вмешательство при обострении хронического панкреатита:

- применить пузырь со льдом
- приготовить к введению антиферментные препараты
- срочная госпитализация
- применить грелку
- применить обезболивающие средства
- постановка очистительной клизмы

#К первому этапу диспансеризации относят:

- определение диспансерных групп населения
- активное выявление лиц, подлежащих учету
- активное врачебное и сестринское наблюдение
- организация общественно-профилактических мероприятий

#Ко второму этапу диспансеризации относят:

- активное выявление пациентов и организация учета
- активное врачебное и сестринское наблюдение
- определение лиц, подлежащих диспансеризации
- организация общественно-профилактических мероприятий

#К третьему этапу диспансеризации относят:

- активное врачебное и сестринское наблюдение
- активное выявление пациентов и организация учета

- определение лиц, подлежащих диспансеризации
- организация общественно-профилактических мероприятий

#К четвертому этапу диспансеризации относят:

- организацию общественно-профилактических мероприятий
- активное выявление пациентов и организация учета
- активное врачебное и сестринское наблюдение
- определение лиц, подлежащих диспансеризации

#К первой группе диспансеризации относятся пациенты:

- подростки
- юноши призывного возраста
- медицинские работники
- работники пищеблока
- перенесшие острые простудные заболевания
- перенесшие реконструктивные операции

#Ко второй группе диспансеризации относятся пациенты:

- длительно и часто болеющие хроническими заболеваниями
- практически здоровые
- длительно и часто болеющие простудными заболеваниями
- перенесшие острые воспалительные заболевания

#Пищевые продукты, рекомендуемые пациенту с гипертонической болезнью:

- нежирные сорта мяса
- овощные салаты
- фрукты, ягоды
- хлеб грубого помола
- жирные мясные бульоны
- сдобное тесто
- соленые закуски

#Лечебно-профилактические мероприятия, необходимые пациентам со стенокардией:

- дозированная физическая нагрузка
- сбалансированное питание
- здоровый образ жизни
- борьба с избыточным весом
- базовая медикаментозная терапия
- дыхательная гимнастика
- закаливание

#При назначении анаприлина пациенту сестра ведет контроль за:

- пульсом
- артериальным давлением
- диурезом
- массой тела
- отеками

#Факторы риска при ИБС:

- избыточная масса тела
- гиперхолестеринемия
- гиподинамия
- сахарный диабет
- вредные привычки
- хронические очаги инфекции
- аллергозы

#Особенности диетического питания при ревматизме:

- ограничение соли
- ограничение жидкости
- ограничение жиров
- ограничение углеводов
- ограничение белков
- ограничение витаминов
- увеличение жидкости

#Вторичная профилактика ревматизма:

- введение бициллина
- прием салицилатов
- прием нестероидных противовоспалительных препаратов
- прием сульфаниламидных препаратов
- витаминотерапия
- прием мочегонных препаратов

#Карта диспансерного наблюдения (форма 30) необходима для контроля за:

- периодичностью обследований диспансерной группы
- сроками диспансеризации пациентов
- эффективностью диспансеризации
- сроками временной нетрудоспособности пациентов
- заболеваемостью на участке
- регистрацией дней нетрудоспособности на участке

#Препараты железа сестра порекомендует принимать:

- после еды
- вместе с витамином С

- до еды
- во время еды
- запивая молоком
- запивая соком цитрусовых

#При длительном лечении пациентов преднизолоном необходим контроль:

- сахара крови
- кала на скрытую кровь
- количества гемоглобина крови
- сахара мочи
- количества лейкоцитов крови
- белка крови

#Диетическое питание при хроническом гломерулонефрите :

- ограничение соли
- ограничение жидкости
- увеличение углеводов
- ограничение жиров
- исключение животных белков
- ограничение витаминов

#Проба по Зимницкому проводится для определения:

- выделительной функции почек
- концентрационной функции почек
- соотношения дневного и ночного диуреза
- лейкоцитурии
- бактериурии
- глюкозурии

#Препараты, длительный прием которых может вызвать развитие гастрита:

- салицилаты
- стероидные гормоны
- сердечные гликозиды
- спазмолитики
- антигистаминные препараты
- антациды

#При обострении язвенной болезни в первые сутки назначают:

- голод
- обильное питье
- стол № 2
- кефир
- куриный бульон

#Инсулин необходимо вводить:

- за 20 минут до приема пищи
- непосредственно перед приемом пищи
- во время приема пищи
- через 20 минут после приема пищи

#Глазные симптомы при тиреотоксикозе:

- пучеглазие
- редкое мигание
- блеск глаз
- нистагм
- частое мигание

#Острый аппендицит характеризуется болями:

- постоянными, малой интенсивности
- схваткообразными, резкими
- опоясывающими, резкими
- острыми, "кинжальными",

#Для артериального кровотечения характерно:

- выход крови пульсирующей струей
- алый цвет вытекающей крови
- быстрое снижение АД
- выход крови медленной струей
- темный цвет крови
- повышение АД

#Приемы временной остановки кровотечения:

- наложение жгута
- наложение давящей повязки
- наложение кровоостанавливающего зажима
- пальцевое прижатие сосуда к кости
- ушивание сосуда
- замена сосуда протезом

#При диспансерном наблюдении пациента, страдающего хроническим геморроем, рекомендуется:

- исключение работ, связанных с поднятием тяжестей
- исключение алкоголя
- исключение острых блюд из диеты
- наблюдение проктолога
- горячие ванны
- применение местных физиотерапевтических процедур

#Прогнозировать рак желудка можно у пациентов:

- с хроническим анацидным гастритом
- с полипозом желудка
- с гиперацидным гастритом
- со стенозом привратника желудка

#Осложнения варикозного расширения вен :

- тромбофлебит
- кровотечение из варикозных узлов
- трофические язвы
- облитерирующий эндартериит
- лимфаденит

#Характерные симптомы доброкачественной опухоли:

- отсутствие метастазов
- наличие метастазов
- подвижность
- интоксикация
- четкие границы
- быстрый рост

#Сестринский уход за пациентом с колоностомой предполагает обработку:

- калоприемника 5% раствором перманганата калия
- мацерированной кожи пастой Лассара
- кожи 5% спиртовой настойкой йода
- калоприемника 1% раствором хлорамина

#Сестринское вмешательство при ушибах мягких тканей предполагает:

- наложение фиксирующей повязки
- применение пузыря со льдом
- применение грелки
- постановку согревающего компресса
- прием анальгетиков

#Ведущие признаки облитерирующего эндартериита:

- отек конечности
- снижение наполнения пульса на тыльной артерии стопы
- образование гематомы
- боли в конечностях в покое
- перемежающаяся хромота

#Основные патологические изменения при остеохондрозе происходят в:

- межпозвоночных дисках
- телах позвонков
- межпозвоночных суставах
- связочном аппарате

#Для профилактики облитерирующего эндартериита пациентам рекомендуют:

- соблюдение гипохолестериновой диеты
- усиление физической нагрузки
- употребление пищи, богатой животными жирами
- отказ от курения

#Сестринское вмешательство при ущемленной пупочной грыже:

- введение обезболивающих средств
- применение пузыря со льдом
- применение грелки
- срочная госпитализация
- вправление грыжевого выпячивания

#Осложнения применения оральных контрацептивов:

- выкидыши
- тромбозы
- нарушения функции печени
- тошнота, рвота
- увеличение веса
- рак яичников

#Сроки проведения первичного сестринского патронажа к новорожденному:

- на 4-5 день
- на 6-7 день
- по вызову родителей
- в первые 3 дня после выписки

#Задачи первичного патронажа к новорожденному:

- консультирование по вопросам планирования семьи
- оценка состояния новорожденного
- консультирование по организации вакцинации
- оценка состояния матери
- оценка социально-бытовых условий

#Содержание первичного патронажа:

- обучение и проведение гигиенической ванны
- введение витамина Д

- проведение туалета пупочной ранки
- обучение уходу за новорожденным
- проведение I комплекса массажа

#Профилактика гипогалактии:

- УФО на молочные железы
- фиксирующая повязка на молочную железу
- сцеживание молока после кормления
- соблюдение режима, питания матери
- снятие стрессов
- достаточный сон матери

#Проявления вестибулярных расстройств у пожилых:

- плохая разборчивость речи
- тошнота
- нарушение равновесия
- ухудшение восприятия звуков
- головокружение

#Профилактика пролежней у тяжелобольных:

- изменение положения тела каждые 2 часа
- смена постельного и нательного белья по необходимости
- применение поролоновых подушек
- обработка кожи 5% раствором перманганата калия
- применение резинового круга

#Основные симптомы сенильной деменции:

- нарушение ориентации
- бред
- нарушение речи
- нарушение восприятия
- нарушение памяти
- судороги

#Сестринский уход за пожилыми с обострением хронической сердечной недостаточности:

- термометрия каждые 2 часа
- профилактика пролежней
- контроль за суточным водным балансом
- организация диетпитания
- контроль за динамикой отеков
- создание комфортного положения в постели

#Особенности фармакологического действия лекарственных

средств у пожилых:

- быстрое всасывание
- редкое развитие побочных эффектов
- медленное всасывание в ЖКТ
- медленное выведение из организма
- частое развитие побочных эффектов

#Основные симптомы глаукомы:

- потеря бинокулярного зрения
- сужение полей зрения
- помутнение хрусталика
- повышение офтальмотонуса
- повышение внутриглазного давления
- сильные головные боли

#Основные симптомы катаракты:

- повышение офтальмотонуса
- потеря бинокулярного зрения
- помутнение хрусталика
- афакия
- слепота
- сужение полей зрения

#Определение I группы инвалидности предполагает:

- предоставление облегченных условий труда
- перевод на работу более низкой квалификации
- освобождение от работы в условиях производства
- необходимость в постоянном постороннем уходе

#Определение II группы инвалидности предполагает:

- предоставление обычных условий труда
- освобождение от работы в условиях производства
- необходимость в постоянном постороннем уходе

#Определение III группы инвалидности предполагает:

- предоставление обычных условий труда
- необходимость в постоянном постороннем уходе
- предоставление облегченных условий труда
- освобождение от работы в условиях производства

#Основные задачи диспансеризации:

- выявления лиц, подлежащих активному врачебному наблюдению
- составление и реализация плана профилактических мероприятий
- снижение заболеваемости с утратой нетрудоспособности

- активная иммунизация населения
- учет лиц, пенсионного возраста

#Основные симптомы кардиогенного шока:

- резкое повышение артериального давления
- экспираторное удушье
- жгучие боли за грудиной
- нитевидный, слабого наполнения пульс
- резкая бедность кожных покровов, холодный пот
- резкое падение артериального давления

#Пациенту, перенесшему операцию на желудке, рекомендуются блюда:

- капустные котлеты
- сливки
- отварное мясо
- протертые каши
- слизистые супы
- мясное суфле

#Продукты, замедляющие перистальтику кишечника:

- черничный отвар
- отварное мясо
- свекла
- свежие яблоки
- отварная рыба
- гренки

#Продукты, усиливающие перистальтику кишечника:

- отварное мясо, рыба
- каша-"размазня"
- жареные блюда
- свекла
- яблоки
- капуста

#Основные признаки врожденного вывиха бедра у взрослых:

- гиперемия кожных покровов над суставом
- изменение длины конечности
- отек в области сустава
- развитие "утиной" походки
- искривление голеней

#Стационарному лечению подлежат пациенты с рожистым воспалением, локализующимся в области:

- кисти
- голени
- стопы
- лица
- шеи

#Диспансерному наблюдению в I группе здоровья подлежат дети:

- здоровые
- с хроническими заболеваниями
- с аномалиями конституции
- с фоновой патологией

#Диспансерному наблюдению во II группе здоровья подлежат дети:

- с хроническими заболеваниями
- с аномалиями конституции
- с аллергическими заболеваниями
- часто болеющие ОРВИ

#Диспансерному наблюдению в III группе здоровья подлежат дети:

- часто болеющие ОРВИ
- с дефицитом массы 10-20%
- с пороками развития
- с хроническими заболеваниями

#К группе риска по туберкулезу относятся дети, имеющие:

- семейный контакт с больными
- аномалии конституции
- иммунодефицитные состояния
- сахарный диабет
- избыточный вес
- курс лечения кортикостероидами

#Родители при вакцинации детей имеет право на:

- информацию о вакцине
- информацию о возможных осложнениях
- выбор способа введения вакцины
- выбор дозы вакцины
- отказ от вакцинации
- возмещение ущерба вследствие проведенной вакцинации

#При проведении вакцинации сестра обязана:

- самостоятельно принять решение о вакцинации
- вакцинировать в присутствии врача
- информировать родителей о предстоящей вакцинации

- соблюдать правила асептики и антисептики
- соблюдать ?холодовую? цепочку хранения вакцин
- знать свойства вакцины, дозу, способ введения

#Постоянные противопоказания к вакцинации:

- злокачественные болезни
- фебрильные судороги
- анафилактический шок на предыдущую вакцинацию
- прогрессирующая неврологическая патология
- аномалия конституции

#Признаки тяжелой прививочной реакции:

- фебрильные судороги
- повышение температуры тела свыше 40 ? С
- повышение температуры тела до 37,0-38,0 ? С
- анафилактический шок
- гиперемия, отек более 8 см в месте введения вакцины

#Патологическая прививочная реакция регистрируется в:

- журнале сестринских назначений
- паспорте участка
- журнале профилактических прививок
- прививочной карте ребенка
- экстренном извещении

#После проведения вакцинации сестра прививочного кабинета должна наблюдать за ребенком в течение:

- 30 минут
- 1-го часа
- 2-х часов
- 3-х часов

#Интервал между профилактическими прививками должен быть не менее:

- 2-х недель
- 3-х недель
- 45 дней
- 1 мес.

#Основные симптомы острого гломерулонефрита:

- положительный симптом Кернига
- лейкоцитурия, бактериурия
- положительный симптом Пастернацкого
- гематурия, протеинурия, цилиндрурия
- отеки, гипертензия, олигурия

#Учетная медицинская форма № 30 - это:

- список лиц, подлежащих медицинскому осмотру
- контрольная карта диспансерного наблюдения
- амбулаторная карта
- справка о состоянии здоровья пациента

#Основные симптомы острого пиелонефрита:

- пиурия, дизурия
- гематурия, протеинурия
- отеки, гипертензия
- положительный симптом Пастернацкого
- лихорадка

#Характерные признаки легочного кровотечения:

- ярко-красный цвет крови
- несвертываемая пенная кровь
- темная кровь в виде сгустков
- наличие примесей пищи

#Причины кровотечения в первые три месяца беременности:

- варикозное расширение вен влагалища
- предлежание плаценты
- угрожающий и начавшийся выкидыш
- прервавшаяся внематочная беременность

#Причины частых кровотечений в конце беременности:

- начавшийся выкидыш
- разрыв матки
- предлежание плаценты
- пузырный занос

#Сестринское вмешательство при носовом кровотечении:

- прижатие крыла носа к носовой перегородке
- передняя тампонада носовых ходов
- прижигание слизистой 30% раствором ляписа
- проведение задней тампонады
- запрокинуть голову
- применить холод на область лба
- опустить голову

#При передней тампонаде носовых ходов марлевые тампоны смачиваются:

- стерильным глицерином
- раствором фурациллина

- борным спиртом
- 3% раствором перекиси водорода

#Характерные симптомы почечной колики:

- дизурия
- кетонурия
- выраженные боли в правом подреберье
- выраженные боли в поясничной области и по ходу мочеточника
- пиурия

#Сестринское вмешательство при острой задержке мочи:

- мониторинг состояния
- катетеризация мочевого пузыря
- применение мочегонных препаратов
- применение анальгетиков
- консультация врача

#Характерные симптомы острого аппендицита:

- разлитая болезненность в правом подреберье
- локальная болезненность в правой подвздошной области
- местное напряжение брюшной стенки в правой подвздошной области
- рвота "кофейной гущей"

#Сестринское вмешательство при подозрении на острый аппендицит включает:

- применение пузыря со льдом
- экстренную госпитализацию в хирургический стационар
- применение слабительных препаратов и клизм
- применение грелки
- введение наркотических анальгетиков

#Сестринское вмешательство при остром приступе холецистита:

- применение грелки
- применение спазмолитических препаратов
- применение пузыря со льдом
- применение очистительной клизмы
- применение морфина

#Клинические симптомы прободной язвы желудка:

- острая "кинжальная" боль в эпигастральной области
- резкое напряжение брюшной стенки
- многократная рвота
- пенистая розовая мокрота

#Сестринский уход за пациентом с сухим непродуктивным кашлем:

- дача теплого щелочного питья
- создание дренажного положения
- проведение ингаляций (щелочно-масляные, с ферментами)
- дача противокашлевых средств (либексин, глауцин и др.)
- проведение горчичных обертываний, ножных ванн
- оксигенотерапия с пеногасителями

#Характерные особенности инсулинонезависимого сахарного диабета:

- постепенное начало, чаще после 40 лет
- склонность к ожирению
- возможность лечения таблетированными сахароснижающими препаратами
- острое начало, чаще в детском и юношеском возрасте
- склонность развитию гипергликемических ком

#Сестринское вмешательство при пищевом отравлении:

- промывание желудка, исследование промывных вод
- высокая очистительная клизма
- холод на эпигастральную область, голод
- дача активированного угля

#Характеристика болей при гастрите с пониженной секреторной активностью:

- боли в левой подвздошной области, понос
- боли в правом подреберье, горечь во рту
- боли в эпигастрии, отрыжка "тухлым"
- тяжесть в эпигастральной области после еды, вздутие живота

#Основные симптомы гипергликемической комы:

- потеря аппетита, жажда, запах "ацетона" изо рта
- гипотония мышц, размягчение глазных яблок
- гипертония мышц, судороги
- потливость, тремор, головокружение, чувство голода
- сонливость, потеря сознания

#Сестринское вмешательство при гипогликемической коме:

- ввести гипотензивные средства
- дать белый хлеб, сладкий чай
- ввести адреноблокаторы
- ввести 40% глюкозы 40 мл внутривенно

#Факторы риска сахарного диабета:

- наследственный фактор
- ожирение

- психическая травма
- гипертензия
- избыточное употребление углеводов

#Ведущие симптомы почечной колики:

- боли и рези при мочеиспускании
- ноющие боли в пояснице
- частые позывы на мочеиспускание
- высокая лихорадка
- приступообразные острые боли в поясничной области

#Сестринский процесс во второй стадии лихорадки:

- мониторинг жизненноважных функций
- частая смена нательного и постельного белья
- обильное витаминизированное питье
- применение физических средств охлаждения
- горячее питье, согревание пациента

#Сестринское вмешательство при гипертоническом кризе:

- приподнять головной конец кровати
- наложить венозные жгуты
- поставить горчичники на затылок и икроножные мышцы
- дать под язык таблетку клофелина, нифедипина
- вызвать врача

#Сестринское вмешательство при приступе бронхиальной астмы:

- создать возвышенное полусидячее положение
- провести ингаляции с беротеком, астмопентом и др.
- провести ингаляции инталом
- дать анаприлин
- подготовить к введению эуфиллина
- вызвать врача

#Сестринское вмешательство при обмороке:

- приподнять ножной конец кровати
- расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить доступ свежего воздуха
- дать нитроглицерин под язык
- применить физические методы раздражения
- приподнять головной конец кровати
- вызвать врача

#Сестринское вмешательство при почечной колике:

- тепло на поясничную область
- дать спазмолитики

- применить мочегонные средства
- провести катетеризацию мочевого пузыря
- вызвать врача

#Ведущие симптомы язвенной болезни 12-перстной кишки:

- боли в эпигастральной области через 30 минут после еды
- боли в правом подреберье через 4 часа после еды
- рвота, приносящая облегчение
- ночные голодные боли
- анорексия

#Ведущие симптомы менингококкового менингита у детей грудного возраста:

- симптом Брудзинского
- симптом Кернига
- выбухание и напряжение большого родничка
- громкий монотонный плач
- симптом Бабинского

#Характерные симптомы локализованной формы дифтерии зева:

- на миндалинах налет серо-белого цвета в виде островков или плотных пленок
- гиперемизированные, увеличенные миндалины с желтоватым налетом
- образование эрозивных поверхностей на миндалинах при попытках удаления налета
- отечность, гиперемия задней стенки глотки

#Признаки ботулизма:

- геморрагическая сыпь
- расстройство глотания
- расстройство зрения
- рвота, частый жидкий стул
- расстройство дыхания
- запоры и вздутие живота

#Тактика сестринского вмешательства в период максимального повышения температуры:

- растереть кожу раствором столового уксуса
- положить холодный компресс на лоб
- приложить грелку к ногам
- положить холод на магистральные сосуды
- обеспечить обильным питьем
- провести горячие ножные ванны

#Тактика сестринского вмешательства при критическом снижении температуры:

- приложить грелку к ногам
- проводить частую смену белья
- растереть кожу 40% раствором спирта
- напоить теплым чаем
- обеспечить высококалорийным питанием
- проводить мониторинг жизненно-важных функций организма

#Российское законодательство предусматривает юридическую ответственность медицинской сестры при:

- нарушении техники манипуляций, повлекших смерть пациента
- побочном действии медикаментозных средств
- хищении лекарственных средств
- неоказании помощи пациенту, приведшим к ухудшению или смерти
- обжаловании действий администрации больницы
- нарушении правил асептики, приведшим к распространению заразных болезней

#Проба Манту применяется:

- для отбора лиц для ревакцинации БЦЖ
- для раннего выявления туберкулеза у детей, подростков
- для определения инфицированности туберкулезом
- для выявления гипергических реакций на туберкулез у инфицированных
- для выявления неспецифической аллергии

#Для выраженного стеноза устья аорты характерны:

- загрудинные боли, дискомфорт типа стенокардии
- кровохарканье
- обмороки-головокружения

#Для митрального стеноза характерны:

- загрудинные боли типа стенокардии
- кровохарканье
- одышка при физической нагрузке

#Осложнения гипертонической болезни:

- отек легких
- гемморрагический инсульт
- ишемический инсульт
- инфаркт миокарда
- кардиогенный шок

#Нарушение уродинамики возможно при:

- редких опорожнениях мочевого пузыря
- мочекаменной болезни
- беременности
- аденомах простаты
- запорах

#Сухость кожи, гиперкератоз, накопление массы, выпадение волос, гипомимия, замедление мышления, сонливость подозрительны на:

- гипотиреоз
- гипертиреоз

#Периодические приступы ярковоспалительных изменений 1 плюсне фалангового сустава бывают при:

- артрозе
- подагре

#Осложнения сахарного диабета:

- инсульт
- инфаркт
- гангрена
- слепота
- образование камней в почках

#При гемартрозе на фоне гемофилии показаны:

- иммобилизация мягкая
- обезболивание подкожным введением наркотиков
- обезболивание внутримышечным введением анальгетиков
- охлаждение сустава

#Больным гематологического профиля противопоказаны:

- усиленная белково-витаминная диета
- солнечная инсоляция
- физиопроцедуры
- прогулки на свежем воздухе
- мытьё в горячей бане

#"Механический ритм" болей в суставах характерен для:

- артроза
- ревматоидного артрита

#Поражения пястно-фаланговых суставов II-III пальцев кисти визитная карточка:

- ревматоидного артрита
- артроза

#Опасное осложнение длительной гормонотерапии:

- язвообразование
- угнетение кроветворения
- остеопорозы, патологические переломы
- повышение массы тела
- наслоение тяжелых инфекций
- повышение уровня мочевой кислоты
- нарушение углеводного обмена

#Коллагенозы обостряются при:

- длительном пребывании на свежем воздухе
- солнечной инсоляции
- переохлаждении
- беременности, родах, абортах
- систематическом переедании
- лучевых воздействиях

#Голод, холод, покой показаны на I этапе:

- при остром животе
- при атонических запорах
- при желудочно-кишечных кровотечениях
- при закрытых травмах живота

#В начальном периоде появления фурункула следует применять:

- смазывание фурункула настойкой йода
- УВЧ-терапия
- влажные компрессы

#При абсцедировании фурункула следует применять:

- удаление некротического стержня
- гипертонические растворы
- УФО на область раны
- выдавливание гнойника
- вскрытие гнойника

#Для постинъекционного абсцесса характерны:

- припухлость, гиперемия кожи
- симптом флюктуации
- повышение температуры
- боль в зоне абсцесса
- симптом "лимонной корки"

#Симптомы характерные для перелома основания черепа:

- кровоизлияние в окологлазную клетчатку
- потеря сознания в момент получения травмы
- ликворея из носа и ушей
- истечение крови из ушей
- парезы и параличи, развивающиеся сразу после получения травмы
- гематома в области сосцевидного отростка
- симптом "очков"

#Для острого гнойного послеродового мастита характерны:

- высокая лихорадка
- боль в области молочной железы
- пальпаторное определение в молочной железе участка уплотнения с флюктуацией
- уменьшение лактации

#Для мастопатии характерны:

- боль в молочной железе перед менструацией
- отсутствие пальпаторных образований в молочной железе
- двусторонность поражения
- наличие увеличенных подмышечных лимфоузлов

#Для рака молочной железы характерны:

- наличие пальпируемого в молочной железе узла, сращенного с кожей
- увеличение региональных лимфоузлов
- втяжение соска
- появление на коже патологической морщинистости над узлом
- отсутствие увеличения подмышечных лимфоузлов

#Наиболее характерными клиническими признаками перелома ребер являются:

- боль в области перелома
- ограничение экскурсии грудной клетки
- учащение дыхания
- патологическая подвижность ребер в области перелома
- хрипы в легких в первые сутки перелома

#Больной вирусным гепатитом А опасен как источник инфекции:

- В последние 7-10 дней инкубации
- В продромальный период
- В первые 2-3 дня желтушного периода
- В период реконвалесценции

#При контакте с больным вирусным гепатитом А введение гамма-глобулина эффективно:

- до 3 дня
- до 7 дня
- до 10 дня
- в течение всего инкубационного периода

#Противопоказания к применению оральных контрацептивов:

- повышение свертывающей системы крови
- патология менструальной функции
- цирроз печени
- тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы

#Факторами риска по развитию трещин сосков являются:

- втянутый сосок
- недоразвитие сосков
- недостаточный гигиенический уход за сосками при кормлении
- гиперпигментация сосков
- неправильное прикладывание к груди

#Зуд, жжение вульвы, дизурические явления, обильные пенистые бели характерны для:

- гонореи
- туберкулеза гениталий
- метроэндометрита
- кандидамикоза
- трихомониаза

#Зуд, обильные творожистые выделения из половых путей характерны для:

- трихомониаза
- гонореи
- сифилиса
- хламидиоза
- кандидамикоза

#Особенностью гонореи у женщин являются:

- высокая частота поражения влагалища
- наличие характерных слизисто-гнойных выделений из цервикального канала
- связь обострения с менструальным циклом

#Учащенное, болезненное мочеиспускание, жжение, гнойные выделения из половых путей характерны для:

- трихомониаза
- гонореи
- метроэндометрита
- молочницы
- сифилиса

#Боли перед и во время месячных, кровянистые выделения до и после месячных, бесплодие характерны для:

- Полипа шейки матки
- Туберкулеза гениталий
- Эндометриоза
- Миомы матки
- Ограниченного сальпингоофорита

#При подозрении на прервавшуюся внематочную беременность на I этапе необходимы:

- горизонтальное положение пациентки
- холод на низ живота
- введение гемостатиков
- госпитализация на носилках в гинекологию
- восполнение ОЦК
- обезболивание

#Прикорм - это:

- в связи с недостатком грудного молока, добавление молочных смесей
- введение новой пищи, постепенно заменяющей кормление грудью

#Докорм - это:

- введение новой пищи, постепенно заменяющей кормление грудью
- в связи с недостатком грудного молока, добавление молочных смесей

#Прикорм дается:

- до кормления грудью матери
- после кормления грудью матери

#Докорм дается:

- до кормления грудью матери
- после кормления грудью матери

#Период разгара рахита характеризуется:

- Повышенной возбудимостью
- Размягчением костей черепа
- Деформацией конечностей

-Облысением затылка

#Начальный период рахита характеризуется:

- Повышенной возбудимостью ЦНС и потливостью
- Деформацией конечностей
- Изменениями внутренних органов

#Исследование мазка из зева при дифтерии производится:

- натощак
- после еды
- через 2 часа после полоскания рта водой

#Для клиники краснухи характерно:

- увеличение заднешейных и затылочных лимфоузлов
- повышение температуры
- катаральные явления
- конъюнктивит
- пятнисто-папулезная сыпь
- жидкий стул
- боли в суставах

#Для ветряной оспы характерно:

- папула
- везикулы
- пустулы
- корочки
- мелкоточечные высыпания
- геморрагические высыпания

#Источником коклюшной инфекции может быть:

- больной в продромальном периоде
- больной в разгаре болезни
- реконвалесцент

#О развитии паратонзиллярного абсцесса у больного с ангиной свидетельствует:

- Боль в горле при глотании
- Сухость в горле и першение
- Ограничение открытия рта
- Гнусавость голоса
- Односторонний отек слизистой оболочки зева
- Слюнотечение

#Для заглоточного абсцесса наиболее характерно:

- Затрудненное дыхание
- Возраст ребенка до 3 лет
- Затрудненное открывания рта
- Отказ от еды из-за боли при глотании
- Выбухание задней стенки глотки
- Ограничение подвижности шеи

#Носовые кровотечения могут быть обусловлены:

- гипертоническим кризом
- заболеванием крови
- местными изменениями слизистой носа
- передозировкой аспирина
- передозировкой антибиотиков

#Классические клинические черты опоясывающего лишая:

- асимптомные высыпания
- лихорадка
- болезненность в местах высыпаний
- сгруппированные сливающиеся везикулы

#Клинике геморрагического инсульта соответствует:

- внезапное начало, часто на фоне высокого АД
- гиперемия лица
- преобладание очаговой симптоматики над общемозговой
- часто симптомы раздражения мозговых оболочек
- повышение температуры

#Клинике ишемического инсульта соответствует:

- постепенное нарастание симптоматики в течение нескольких часов
- преобладание очаговой симптоматики над общемозговой
- чаще пожилой возраст больного
- гиперемия лица
- обычно пониженное АД